

Проктіс-М плюс / Proktis-M plus мазь ректальна

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

(АНГЛІЙСЬКИЙ ВАРІАНТ ІТАЛІЙСЬКОЇ ВЕРСІЇ IT 54 F.I. DATA Oстаннього ПЕРЕГЛЯДУ 07-05.2017)

Уважно ознайомтесь із інструкцією для медичного застосування, яка знаходиться в упаковці: в ній міститься важлива інформація для пацієнта. Цей медичний виріб відпускається без рецепта лікаря. Однак для отримання кращої ефективності, його слід застосовувати згідно з описаними показаннями.

- Зберігайте цю інструкцію для медичного застосування, щоб у разі потреби її можна було знову прочитати.
- За додатковою інформацією, зверніться до лікаря і/або фармацевта.
- Якщо протягом деякого часу симптоми зберігаються, проконсультуйтеся з лікарем.

Proktis-M® plus Проктіс-М® плюс Мазь ректальна

СКЛАД

Білий вазелін, рідкий парафін, пропіленгліколь, полідоканол, фітосоми есцину бета-ситостеролу, гліцерретинова кислота, бутилокситолуол, натрієва сіль гіалуронової кислоти.

ФОРМА ВИПУСКУ

ПРОКТИС-М ПЛЮС – це мазь для ректального застосування. Упаковка містить одну алюмінієву тубу по 30 г з канюлею-аплікатором.

ПОКАЗАННЯ

Допоміжна терапія для посилення репаративних процесів у ділянці анально-ректального каналу після проктологічної операції; при внутрішньому та зовнішньому геморої; проктиті; криптиті, анальних тріщинах; фісурах прямої кишки; періанальних норицях.

КОЛИ НЕ СЛІД ЗАСТОСОВУВАТИ ВИРІБ

Не застосовувати у разі індивідуальної підвищеної чутливості до одного з компонентів виробу.

Вагітність та годування груддю

За таких обставин проконсультуйтеся з лікарем.

Вплив на здатність керувати транспортним засобом або іншими механізмами

Особливі запобіжні заходи не передбачені.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ

Взаємодія з іншими засобами не досліджувалась, у зв'язку з чим перед застосуванням мазі ректальної ПРОКТИС-М ПЛЮС разом з іншими медичними виробами або лікарськими засобами для ректального застосування рекомендується проконсультуватися з лікарем.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Вимийте руки до та після використання медичного виробу.

Нанесіть мазь місцево тонким шаром. Внутрішньоректальне застосування полегшується зручною канюлею, яка входить у комплект.

1 Прикрутити канюлю до туби та стиснути тубу доки канюля не заповниться маззю.

Проктіс-М плюс / Proktis-M plus мазь ректальна

2 Вставити канюлю в анальний канал і знову стиснути тубу, щоб витекла невелика кількість мазі.

3 Очистити аплікатор після використання та закрити його захисним ковпачком.

Медичний виріб призначений для особистого користування.

КОЛИ ТА ПРОТЯГОМ ЯКОГО ЧАСУ ЗАСТОСОВУВАТИ

Застосувати двічі на добу, вранці та ввечері, якщо можливо – після очисної клізми.

НЕБАЖАНІ ЕФЕКТИ

Використання виробів для місцевого застосування, особливо довготривале, може спричинити сенсibiliзацію. Якщо це трапляється, припиніть лікування та зверніться до лікаря для проходження відповідної терапії. У разі виникнення інших небажаних ефектів, повідомте вашого лікаря або фармацевта.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати контакту з очима. Не ковтати.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ, УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

Термін придатності стосується лише виробу у непошкодженій упаковці, що зберігався належним чином. Не використовувати після закінчення терміну придатності, якщо упаковка була відкрита або пошкоджена. Зберігати медичний виріб у щільно зачиненій тарі, у захищеному від світла й тепла місці. Утилізація медичного виробу шляхом викидання у каналізацію або побутове сміття не допускається. Запитайте фармацевта, як утилізувати медичні вироби, які більше не використовуються. Це допоможе захистити навколишнє середовище.

МЕДИЧНИЙ ВИРІБ  0373



Виробник: FARMA-DERMA s.r.l. / ФАРМА-ДЕРМА с.р.л.

Via dell'Artigiano 6-8 - 40010 Sala Bolognese (BO) ITALY /

Via делл'Артигіано 6-8- 40010 Сала Болоньезе (BO) ІТАЛІЯ