

Супозиторії ректальні

# Proktis-M®

## Проктіс-М

### **СКЛАД**

Натрієва сіль гіалуронової кислоти 5 мг, олійний екстракт центели азіатської, олійний екстракт календули, олійний екстракт алое вера, ефірна олія чайного дерева, напівсинтетичні гліцериди, ВНТ.

### **ФОРМА ВИПУСКУ**

Proktis-M/Проктіс-М це супозиторії для ректального застосування. В упаковці 10 ректальних супозиторіїв по 2 г.

### **ОПИС ВИРОБУ ТА ЦІЛІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ**

Супозиторії ректальні Proktis-M/Проктіс-М діють завдяки наявності гіалуронової кислоти, мукополісахариду, який присутній у великій кількості у багатьох тканинах організму. Гіалуронова кислота функціонує як структурна підтримка, надаючи тканині тонус, живлення та еластичність. Численні клінічні дослідження довели здатність гіалуронової кислоти прискорювати та покращувати процес епітелізації та відновлення тканин.

### **ПОКАЗАННЯ**

Для посилення репаративних процесів в аноректальному каналі після проктологічних операцій; внутрішній та зовнішній геморой; проктит; криптит; анальні тріщини; фісура; перианальні фістули.

### **КОЛИ НЕ СЛІД ЗАСТОСОВУВАТИ**

У разі індивідуальної підвищеної чутливості до одного з компонентів виробу.

#### *Вагітність та годування груддю*

Безпека використання супозиторіїв ректальних Proktis-M/Проктіс-М в період вагітності та годування груддю не досліджувалась. За таких обставин, бажано проконсультуватися з лікарем.

*Вплив на здатність керувати автомобілем, використовувати устаткування або машини*  
Особливі запобіжні заходи не передбачені.

### **ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ**

Взаємодія з іншими засобами не досліджувалась, у зв'язку з цим перед застосуванням супозиторіїв ректальних Proktis-M/Проктіс-М разом з іншими медичними виробами або лікарськими засобами для ректального використання проконсультуйтеся з Вашим лікарем.

### **СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ**

Відкрийте супозиторій, потягнувши за дві попередньо розрізані частини блистеру. Дотримуйтеся правил гігієни: мийте руки до та після використання медичного виробу.

### **КОЛИ ТА ПРОТЯГОМ ЯКОГО ЧАСУ ВИКОРИСТОВУВАТИ**

Використовуйте один супозиторій на добу або згідно з призначенням лікаря. Тривалість застосування залежить від розвитку симптомів; у разі необхідності супозиторії ректальні

Proktis-M/Проктіс-М можна використовувати протягом тривалого періоду.

### **НЕБАЖАНІ ЕФЕКТИ**

Використання виробів для місцевого застосування, особливо довготривале, може спричинити сенсibiliзацію. Якщо це трапляється, припиніть лікування та зверніться до лікаря, для проходження відповідної терапії. У випадку виникнення небажаних ефектів, що не описані у цій листівці, повідомте про це свого лікаря або фармацевта.

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Зберігати у недоступному для дітей місці. Уникати контакту з очима. Не ковтати.

### **ТЕРМІН І УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ**

Термін придатності зазначено на упаковці (EXP), і відноситься до виробу в непошкодженій упаковці, що правильно зберігається. Не використовуйте виріб після дати, зазначеної на упаковці, або якщо упаковка була відкрита або пошкоджена. Зберігайте медичний виріб щільно закритим, подалі від світла та тепла, при температурі від 4°C до 25°C.

### **МЕДИЧНИЙ ВИРІБ СЕ 0373**

#### **Виробник:**

FARMA-DERMA s.r.l.  
Via dei Bersaglieri, 10 - 40010 Sala Bolognese (BO) ITALY

#### **Дистриб'ютор:**

ТОВ «ЄВРОЛЕК»  
вул. Балукова 7, м. Вишневе, 08133 Київська область, Україна

### **Proktis-M®**

#### **Proktis-M**

### **STORAGE:**

Hyaluronic acid sodium salt 5 mg, centella asiatica oil extract, calendula oil extract, aloe vera oil extract, tea tree essential oil, semi-synthetic glycerides, BNT.

### **FORM OF ISSUE:**

Proktis-M/Proktis-M are suppositories for rectal use. The package contains 10 rectal suppositories of 2 g each.

### **PRODUCT DESCRIPTION AND PURPOSES OF ITS USE:**

Proktis-M/Proktis-M rectal suppositories work due to the presence of hyaluronic acid, mucopolysaccharide, which is present in large quantities in many tissues of the body. Hyaluronic acid functions as a structural support, giving the tissue tone, nutrition and elasticity. Numerous clinical studies have proven the ability of hyaluronic acid to accelerate and improve the process of epithelialization and tissue recovery.

### **INDICATION:**

To strengthen reparative processes in the anorectal canal after proctological operations; internal and external hemorrhoids; proctitis; cryptitis; anal fissures; fissure; perianal fistulas.

#### **WHEN NOT TO USE**

In case of individual hypersensitivity to one of the components of the product.

#### **Pregnancy and breastfeeding**

The safety of using rectal suppositories Proktis-M/Proktis-M during pregnancy and breastfeeding has not been studied. In such circumstances, it is advisable to consult a doctor.

#### **Influence on the ability to drive a car, use equipment or machines**

No special precautions are provided.

**INTERACTION WITH OTHER MEANS**  
The interaction with other means has not been studied, therefore, before using rectal suppositories Proktis-M/Proktis-M together with other medical products or medicinal products for rectal use, consult your doctor.

### **APPLICATION METHOD:**

Open the suppository by pulling on the two pre-cut parts of the blister. Follow the rules of hygiene: wash your hands before and after using the medical product.

### **WHEN AND FOR HOW LONG TO USE:**

Use one suppository per day or as directed by your doctor. The duration of use depends on the development of symptoms; if necessary, rectal suppositories Proktis-M can be used for a long period of time.

### **ADVERSE EFFECTS:**

Use of topical products, especially long-term use, may cause sensitization. If this happens, stop treatment and consult a doctor for appropriate therapy. In case of unwanted effects not described in this leaflet, inform your doctor or pharmacist.

### **RESERVATION:**

Keep out of the reach of children. Avoid contact with eyes. Do not swallow.

### **TERM AND CONDITIONS OF STORAGE:**

The expiration date is indicated on the package (EXP) and refers to the product in an undamaged package that has been properly stored. Do not use the product after the date indicated on

packaging, or if the packaging has been opened or damaged. Store the medical product tightly closed, away from light and heat, at a temperature between 4°C and 25°C.

MEDICAL PRODUCT CE 0373

### **Producer:**

PHARMA-DERMA s.g.l.Via dei Versaglieri, 10 - 40010 Sala Volognese (VO) ITALY

Distributor:

"EUROLEK" LLC

St. Balukova 7, Vyshneve, 08133 Kyiv region, Ukraine